



Dieses Schulungsmaterial wurde als risikominimierende Maßnahme beauftragt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Es soll sicherstellen, dass Patienten und Angehörige/Pflegende/Betreuungspersonen die besonderen Sicherheitsanforderungen von Werendi 4,6 mg/24 Stunden, 9,5 mg/24 Stunden und 13,3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster (Rivastigmin) kennen und berücksichtigen.

Leitfaden für die sichere Anwendung – Patienten/ Angehörige/ Pflegende/ Betreuungspersonen

Werendi 4,6 mg/24 Stunden, 9,5 mg/24 Stunden und 13,3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster (Rivastigmin)

Bitte lesen Sie auch die Gebrauchsinformation (Packungsbeilage) zu Werendi 4,6 mg/24 Stunden, 9,5 mg/24 Stunden und 13,3 mg/24 Stunden Transdermales Pflaster aufmerksam durch.






Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Bitte beachten!

- Nehmen Sie das Pflaster vom Vortag ab, bevor Sie **ein** neues Pflaster aufkleben.
- Nur **ein** Pflaster pro Tag anwenden.
- Schneiden Sie das Pflaster nicht in Stücke.
- Drücken Sie das Pflaster für mindestens 30 Sekunden mit der Handfläche fest.

Wie Sie das Pflaster aufkleben


<p>1. Entfernen Sie sorgfältig das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues verwenden.</p>	<p>2. Entnehmen Sie das neue Pflaster der Verpackung.</p>	<p>3. Ziehen Sie eine Hälfte der Schutzfolie ab.</p>	<p>4. Legen Sie das Pflaster mit der selbstklebenden Seite auf die Haut im ausgewählten Anwendungsbereich (oberer oder unterer Rückenbereich, Oberarm oder Brustkorb, siehe Abbildung „Mögliche Anwendungsbereiche“) und ziehen Sie dann die zweite Hälfte der Schutzfolie ab.</p>	<p>5. Drücken Sie dann das Pflaster mindestens 30 Sekunden mit Ihrer Handfläche fest.</p>
				

Wo Sie das Pflaster aufkleben

Entfernen Sie das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues Pflaster aufkleben. Kleben Sie täglich **nur ein** Pflaster auf nur einen der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.

Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des Bereiches.

Mögliche Anwendungsbereiche



MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN

Die Meldung von Nebenwirkungen ist von großer Wichtigkeit für eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln.

Bitte melden Sie Nebenwirkungen dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn

<https://www.bfarm.de/>
oder dem pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten).



Das Schulungsmaterial für Patienten zu Werendi (Leitfaden für die sichere Anwendung – Patienten/ Angehörige/ Pflegende/Betreuungspersonen) sowie die Gebrauchsinformation sind durch Scannen des QR-Codes oder über www.rivastigmin-luye/werendi.de verfügbar.

Gedruckte Exemplare können Sie beim pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten) bestellen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Luye Pharma AG
Am Windfeld 35
83714 Miesbach
medical@luyepharma.eu

